



RAVIMIAMET

# AstraZeneca vaktsiini omadused, ohutus ja kõrvaltoimed

**Triin Suvi**

**Bioloogiliste preparaatide osakonna juhataja**

# Miks on vaktsiini vaja?


- Väheneb raskete haigestumiste hulk
- Tekitab kaitsvad antikehad ja mälurakud ilma haigust läbipõdemata
- Järgmisel kokkupuutel viirusega aktiveerub meie „kaitsevägi“ ja asub rünnakule

# Milles saad kindel olla?

- Kõik vaktsiinid on läbinud põhjalikud uuringud
- Kõiki vaktsiine on hinnatud ühesuguste nõuete alusel
- Kõik Eestis kasutatavad vaktsiinid on tõhusad kaitsmaks raske COVID-19 vastu

# COVID-19 Vaccine AstraZeneca

- Viirusvektoril põhinev vaktsiin
- Kaks annust 8-nädalase vahega, et saavutada vaktsiini maksimaalne tõhusus



# Kliiniliste uuringute tulemused

- Osales ~24 000 inimest
- Vaktsineeritutel ei kujunenud ühelgi korral raskekujulist COVID-19
- 21 päeva pärast esimest süsti ei vajanud ükski vaktsiini saanutest haiglaravi

COVID-19 Vaccine AstraZeneca kaitseb raske COVID-19 eest sama tõhusalt kui teised kasutusel olevad vaktsiinid

# Sagedased küsimused

- Kas vaksineeritu võib siiski haigestuda?
- Kas vaksineeritu või viirust edasi kanda?
- Kui kaua vaktsiini mõju kestab?
- Kas tuleb uuesti vaksineerida ja teha kolmas süst?

# Hea teada

- Arst või õde räägib enne vaktsineerimist läbi võimalikud kõrvaltoimed ning vastab teie küsimustele
- Vaktsiini infolehest on võimalik alati räägitut üle vaadata. Infolehe leiab [ravimiregister.ee](http://ravimiregister.ee)
- Kui vaktsineerimise järgselt tekib mõni kaebus, anna sellest kindlasti vaktsineerijale teada

# Millised on sagedasemad kaebused?

- Süstekoha valu/tundlikkus
- Peavalu
- Lihas- ja liigesvalu
- Palavik
- Külmavärinad
- Väsimus/halb enesetunne
- Iiveldus

Kaebuseid aitavad vähendada paratsetamool, ibuprofeen, külm kompress, puhkus.

Enamik kõrvaltoimetest kerge kuni mõõduka raskusastmega, lahenevad mõne päeva jooksul pärast vaktsineerimist.

Pärast teist annust on kõrvaltoimed kergemad.



# Kas võid ennast vaktsineerida kui ...

- Oled rase, imetav ema või planeerid rasedust?
- Põed mõnda haigust?

Vaktsiini ei tohi manustada, kui oled allergiline mõne koostisosa suhtes.

Vaktsineerimine tuleb edasi lükata kui sul on kõrge palavikuga kulgev haigus või äge infektsioon.

Enne vaktsineerimist saad oma tervist puudutavad asjaolud arsti või õega läbi arutada.